



ЗБОРНИК РЕЗИМЕА



СТРУЧНО-НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ



ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
ЗЛАТИБОР, СРБИЈА 21-24. ФЕБРУАР 2019.



Друштво дефектолога Србије



Универзитет у Београду - Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију

ЗБОРНИК РЕЗИМЕА

СТРУЧНО-НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
ЗЛАТИБОР, СРБИЈА 21-24.ФЕБРУАР 2019.

**ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
ЗЛАТИБОР, 21-24.ФЕБРУАР 2019.**

Издавач

Друштво дефектолога Србије, Косовска 8/1, Београд

Штампа

ПМ плус Д.О.О., 22.октобра 8а, Београд

За организатора

Синиша Ранковић , председник УО Друштва дефектолога Србије
Проф.др Снежана Николић, декан - ФАСПЕР

Организатори

Друштво дефектолога Србије
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Организациони одбор

Маја Матовић
Драгана Пашћан
Милка Лековић
Слободан Банковић
др Стеван Несторов
Драган Роловић
Снежана Чарапић

Програмски одбор

проф.др Весна Вучинић
проф.др Славица Голубовић
проф.др Александра Грбовић
проф.др Дејана Боуилет
проф.др Гордана Николић
проф др Мирослав Вранкић
проф.др Горан Јованић
доц.др Харис Мемишевић
доц.др Златко Буквић
доц.др Миа Шешум
доц.др Слободан Банковић
доц.др Милица Ковачевић
доц.др Милосав Адамовић
др Зорица Поповић
др Стеван Несторов

Генерални секретар

мр Миодраг Недељковић

Технички секретар

Горана Киковић

Секретар за финансије

Радомир Лековић

Технички уредник

мр Миодраг Недељковић

Тираж 500

ИСБН

БИХЕВИОРАЛНИ И ЕМОЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ КОД ДЕЦЕ СА ТУРЕТОВИМ СИНДРОМОМ

Данка М. Радуловић, Наталија Игњатовић

Универзитет у Београду-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Туретов (Tourett) синдром је неуроразвојни поремећај вишеструких моторних и вокалних тикова присутних дуже од годину дана. Најчешће су брзи, невољни, стереотипни покрети и вокализације једноставни-у виду трептања, ушмрквања, искашљавања, стењања и сл., док сложени моторни тикови укључују фацијалне гестикулације, додиривање и мирисање, а вокални понављање речи, псовање, изговарање колоквијалних увреда и сл.

Поремећај почиње да се испољава у детињству, али се компликује присуством других проблема, па је у раду на бази доступне емпиријске грађе анализиран његов коморбидитет са бихевиоралним и емоционалним поремећајима.

Резултати истраживања доследно потврђују да је код већине деце са Туретовим синдромом (60%-70%) дијагностификован дефицит пажње и поремећај хиперактивности (АДХД); док је код 7% деце са АДХД присутан Туретов синдром (неретко провоциран медикаметозно, најчешће стимулансима ЦНС примењиваним у третману АДХД). У значајном делу истраживања пронађено је да деца са Туретовим синдромом редовно испољавају бихевиоралне проблеме, укључујући опозиционо-девијантни поремећај и поремећај понашања, али и поремећаје учења; као и да такву децу карактеришу ниска фрустрациона толеранција, аргументисање, промене расположења и периоди екстремних напада беса и агресивног понашања.

Према налазима других емпиријских студија код деце са Туретовим синдромом чешће се срећу депресија, анксиозност, опсесивност, ниска самопроцена, стид, збуњеност и социјална неприлагођеност, нарочито у школском миљеу. Поред тога, 73-78% ове деце има лоше искуство у релацијама са вршњацима и редовне епизоде плакања због задиркивања од стране друге деце, те по правилу остају социјално изоловани.

Имајући све ово у виду, закључено је да присуство бихевиоралних и емоционалних проблема додатно значајно нарушава квалитет живота и породично, школско и социјално функционисање деце са Туретовим синдромом и ствара потребу да се уз медицинске и стручњаци бихевиоралних профила неизоставно укључују у третман овог поремећаја.

Кључне речи: Туретов синдром, бихевиорални и емоционални проблеми, третман